



شماره: ۳۰۰/۸۶۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

رئیس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: دستور عمل واکسیناسیون مادران باردار با واکسن سینوفارم-مرداد ماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام

با عنایت به درخواست تجویز واکسن سینوفارم در بارداری توسط دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس (نامه شماره ۳۰۲/۸۰۳۸ د مرخ ۱۴۰۰/۰۵/۶) و تایید موضوع در سیزدهمین کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا، نامه شماره ۳۰۴/۸۴۸۹ د مرخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، شرایط تزریق واکسن سینوفارم در مادران باردار آن دانشگاه در برابر بیماری کووید ۱۹ با شرایط اعلام شده زیر قابل انجام است:

۱. واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط، منوط به رضایت وی پس از مشاوره خواهد بود.

نکات لازم به ذکر در مشاوره واکسیناسیون (واکسن سینوفارم) در بارداری

✓ مادران باردار در خطر بالاتر ابتلا به بیماری نیستند، اما در صورت ابتلا اشکال شدید تر بیماری در مادران باردار نسبت به زنان غیر باردار در سن مشابه بیشتر خواهد بود.

✓ واکسن سینوفارم ویروس غیر فعال می باشد، و بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت (با توجه به خطرات تهدید کننده سلامت مادر در صورت ابتلا به کووید-۱۹)، به مادران باردار قابل توصیه است.

✓ به دلیل حفظ اینمی بیشتر تا حصول نتایج و مستندات کافی، ترجیحا واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری صورت پذیرد.

✓ واکسیناسیون به معنای ایجاد اینمی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلا به کووید برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است.

✓ مادران باردار پس از واکسینه شدن در صورت بروز علائم احتمالی ابتلا به بیماری کووید-۱۹، بایستی با اطلاع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی یا کد ۴ سامانه ۴۰۳۰



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۸۶۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

(مادران باردار)، جهت اخذ راهنمایی‌های لازم یا حتی تعیین محل مراجعه بررسی وضعیت،
اقدام نمایند.

۲. توصیه می‌شود واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری انجام شود.

۲. گروه سنی مادران باردار واجد شرایط واکسیناسیون :

✓ همه مادران باردار با سن ۳۵ سال و بالاتر

✓ مادران در همه گروه‌های سنی شاغل در بهداشت و درمان

✓ همه مادران باردار در شرایطی که همسران ایشان در بخش‌های کرونا و یا مراکز بهداشتی
مدیریت کرونا شاغل هستند.

✓ مادران در همه گروه‌های سنی شاغل در گروه‌های شغلی اولویت دریافت واکسن مطابق
دستور عمل‌های واکسیناسیون کشوری

۴. همه مادران باردار با نمایه توده بدنی ۳۵ و بالاتر

۵. همه مادران با بارداری‌های دو قلویی و چندقولویی، بارداری با IVF

۶. همه مادران باردار با بیماری زمینه‌ای شامل بیماری دیابت، قلبی، فشار خون بالا، مصرف داروهای
ایمونوساپرسیو، بیماری مزمن کلیوی، آنماق سیکل سل، پیوند اعضا، سیروز کبدی و آسم

۷. به علت خطرات ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در سه ماهه سوم بارداری، ضمن تأکید بر شناسایی مادران
باردار واجد شرایط، واکسیناسیون مادران واجد شرایط با سن بارداری ۲۸ هفته و بیشتر در اولویت

خواهد بود.

۸. در صورت تزریق دوز اول واکسن قبل از بارداری و یا عدم اطلاع از بارداری در زمان واکسیناسیون،
توصیه می‌شود پس از مشاوره با مادر و بر اساس ترجیح وی (در رابطه با زمان واکسیناسیون)،
تزریق دوز دوم با واکسن سینوفارم به فاصله ۲۸ روز از تزریق قبلی یا بعد از هفت‌ده دوازده بارداری،
صورت پذیرد.

۹. فاصله بین واکسن ویروس کرونا با واکسن آنفلوآنزا یا توام در بارداری حتی الامکان ۱۴ روز باشد.

شماره: ۳۰۰/۸۶۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

۱۰. تزریق ایمونوگلوبولین D تداخلی با واکسن ویروس کرونا ندارد و همانند دستورعمل های ابلاغی سلامت مادران انجام شود.

۱۱. واکسیناسیون مادران باردار شاغل، تابع اولویت های شغلی در دستورعمل های واکسیناسیون کشوری خواهد بود.

۱۲. برای همه مادران باردار شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی، رعایت ضوابط حفظ امنیت شغلی مادران باردار (موضوع نامه دورکاری به شماره ۳۰۰/۲۱۸۰۸ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹) بعد از واکسیناسیون هم الزامی است و در صورت لزوم فعالیت ایشان توجه به نکات ذیل لازم است:

✓ در صورت الزام به فعالیت حضوری ایشان در مراکز بهداشتی و درمانی، تا ۲۸ هفته اول بارداری، محل فعالیت خارج از مراکز مدیریت سرپایی یا بستری بیماران کووید-۱۹ باشد.

✓ در سن بارداری بعد از ۲۸ هفته، اتخاذ تمهداتی برای دورکاری ایشان لازم است.

۱۳. زمان واکسیناسیون در موارد ابتلا یا شک به بیماری کووید در مادر باردار، تابع دستورعمل کشوری واکسیناسیون خواهد بود.

نکته ۱: تأکید و آموزش های لازم در مورد تداوم رعایت پروتکل های پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ به مادران باردار پس از واکسیناسیون الزامی است.

نکته ۲: در مادرانی که تحت درمان با داروهای ضد انعقادی هستند، تزریق واکسن می بایست به صورت عمیق در عضله دلتویید انجام شود.

با عنایت به مطالب پیشگفت، لازم است در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات مادران باردار واجد شرایط واکسیناسیون در آن دانشگاه و اجرای فرایند واکسیناسیون اقدام شود.

کمیته دانشگاهی واکسیناسیون مادران باردار:

کمیته دانشگاهی واکسیناسیون مادران مشکل از مدیر گروه زنان و زایمان، حداقل یک نفر پریناتولوژیست، مدیر گروه عفونی و مدیر گروه داخلی با ریاست معاون محترم بهداشت می باشد. (دعوت به حضور سایر تخصص ها



شماره: ۳۰۰/۸۶۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

بر اساس شرایط مادران باردار به عهده معاون محترم بهداشت خواهد بود. ضمناً دانشگاه‌هایی که برای تشکیل کمیته، متخصص پریناتولوژی ندارند می‌توانند با دانشگاه سر قطب خود هماهنگ نمایند.

مهم ترین موارد نیازمند بررسی در کمیته دانشگاهی واکسیناسیون:

- ✓ مادران با شرایط حاد یا وحامت بیماری‌های زمینه‌ای
- ✓ مادران دارای بیماری‌های زمینه‌ای که در این دستور عمل ذکر نشده
- ✓ مادران متقاضی تزریق واکسن آسترازنیکا

مطابق نامه ۱۲ خرداد ماه سال جاری با عنایت به شرایط واکسن آسترازنیکا، در صورت ترجیح به واکسیناسیون با آسترازنیکا بایستی مورد در کمیته دانشگاهی واکسن مادران باردار بررسی شود و بر اساس تصمیم کمیته و مادر اقدام شود، بدیهی است در صورت عدم صدور مجوز استفاده از این واکسن توسط کمیته، تزریق واکسن سینوفارم بر اساس نظر کمیته انجام می‌پذیرد.

موارد تزریق واکسن مادران باردار در سامانه پورتال سلامت مادران به آدرس www.health.gov.ir دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اداره سلامت مادران ستون لیستها واکسیناسیون مادران باردار ثبت شود. دسترسی ثبت برای کارشناسان ستادی سلامت مادران حوزه بهداشت و کارشناس مسئول مامایی حوزه درمان، کارشناسان مادران ستاد شهرستان و ماما مسئول بیمارستانها فراهم شده است. (نام کاربری و رمز عبور همانند ثبت اطلاعات زایمان در بیمارستان و خارج بیمارستان، سامانه ایمان می‌باشد)

در صورت بروز مشکل یا نیاز به استعلام با شماره تلفن ۰۲۱-۸۱۴۵۴۹۱۹ سرکار خانم هادی پور تماس گرفته

شود.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت
بروز